

CONSEILS POSTOPÉRATOIRES

DRAINAGE DE PLAIE À L'AIDE D'UN DRAIN JACKSON PRATT

But :

- Empêcher l'accumulation de liquide dans les tissus.
- Réduire les risques d'infection.
- Quantifier l'écoulement d'une plaie.

Dosage et surveillance :

- Vider et réamorcer aux huit heures (matin, midi et soir) ou lorsque le dispositif est à demi rempli afin de maintenir la pression négative nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil.
- Noter la quantité et la couleur de l'écoulement.
- S'assurer que le drain est comprimé en tout temps.
- Le liquide prélevé peut être rouge, jaune-rosé ou jaune.



Procédure :

- Laver vos mains avec de l'eau et du savon.
- Déposer une mesure graduée à proximité.
- Ouvrir le bouchon de la poire.
- Presser la poire et vider le liquide dans la mesure graduée.
- S'assurer d'obtenir tout le liquide drainé.
- Recréer la succion en pressant la poire jusqu'à ce que les parois se touchent et remettre le bouchon sur l'orifice de vidange.
- Doser le liquide prélevé et inscrire la quantité ainsi que la couleur sur la feuille prévue à cet effet (la quantité de liquide devrait diminuer avec le temps et devenir moins rouge).
- Vider et mesurer chacun des drains séparément.
- Jeter le liquide prélevé dans la toilette.

Veuillez s.v.p. nous contacter le _____ pour nous aviser du volume de sang écoulé par votre drain depuis les 24 dernières heures.

Si vous avez moins de _____ ml, vous aurez un rendez-vous dans la journée pour faire retirer votre drain.

PATIENT/E : _____

DRAINS : Seins Abdomen Visage

Date	Heure	Côté gauche	Côté droit
	Matin		
	Midi		
	Soir		
	Matin		
	Midi		
	Soir		
	Matin		
	Midi		
	Soir		
	Matin		
	Midi		
	Soir		
	Matin		
	Midi		
	Soir		
	Matin		
	Midi		
	Soir		
	Matin		
	Midi		
	Soir		
	Matin		
	Midi		
	Soir		



Noter la couleur dans la tubulure et la quantité de sang en ml.